

Trzeci Migdałek oraz Skrócone Wędzidełko

Nowoczesne
Interdyscyplinarne leczenie
w Laryngologii i Logopedii




 **MIMIL**
Centrum medyczne

CENTRUM LOGOPEDII I TERAPII PEDAGOGICZNEJ
 **logos**

Przerost trzeciego migdałka i jego wpływ na prawidłowy rozwój mowy

Przerost trzeciego migdałka wiąże się z nieprawidłowym oddychaniem (oddychanie buzią), które może spowodować wadliwy zgryz lub nawet nieprawidłowy rozwój podniebienia, co niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje związane z wadliwą wymową.

trzeci migdałek



Choroby migdałków u dzieci

Trzeci migdał jest jednym z wielu migdałków występujących w obrębie górnych dróg oddechowych. Migdałki pełnią funkcję odpornościową, stanowią naturalną barierę ochronną. U dzieci natomiast migdałki odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż nie jest jeszcze w pełni rozwinięty układ odpornościowy, który byłby całkowicie przygotowany do walki z patogenami z naszego otoczenia. Bardzo często więc, podczas tej walki, stają się one przerosnięte i nabrzmiałe.

Trzeci migdał znajduje się w nosogardle (rys.) - jeżeli jest zbyt duży w otaczającej przestrzeni, powoduje wymuszoną deformację struktur aparatu żucia, aparatu mowy, powoduje blokadę nosa od tyłu jak i blokadę trąbek słuchowych, co przekłada się na problemy słuchowe (nacisk na trąbkę Eustachiusza), oraz finalnie wady wymowy (nosowanie, mowa nosowa) oraz zaburzenia zgryzu.

Objawy przerostu trzeciego migdała

- upośledzenie oddychania przez nos
- mowa nosowa, tzw. nosowanie
- nawracające zapalenia ucha środkowego (obecność płynu w uszach środkowych)
- upośledzenie słuchu
- upośledzenie rozwoju fizycznego
- niespokojny, niepełnowartościowy sen, chrapanie, bezdech w czasie snu
- spowolnienie rozwoju umysłowego ze względu na zmęczenie i niedosłuch
- częste anginy, zapalenia gardła, krtani i tchawicy
- zaburzenia mowy
- wady zgryzu

Leczenie

Precyzyjny zabieg pozwalający na usunięcie trzeciego migdałka wykonany jest z wykorzystaniem podglądu endoskopowego, oraz bezpiecznej techniki harmonicznego. Zabieg jest bardzo mało inwazyjny dla pacjenta oraz całkowicie bezkrwawy, gdyż dochodzi do natychmiastowego zamykania naczynek krwionośnych.




Czym jest i czym grozi skrócone wędzidełko podjęzykowe?

Wędzidełko podjęzykowe to miękki twór włóknisty, pokryty błoną śluzową, łączący dolną część języka z dnem jamy ustnej. Skrócone wędzidełko podjęzykowe (ankyloglossia) jest często występującą zmianą anatomiczną w budowie jamy ustnej.

Kiedy wędzidełko jest zbyt krótkie znacząco ogranicza ruchy języka, co w konsekwencji prowadzi do utrwalenia nieprawidłowego wzorca połykania oraz powoduje liczne wady wymowy.

Skrócenie wędzidełka pojawia się w różnym stopniu i nasileniu, od lekkiego po silne zgrubienie, a nawet do całkowitego unieruchomienia języka.

W języku polskim prawidłowa wymowa wielu głosek wymaga uniesienia czubka języka do górnego wałka dziąsłowego a skrócenie wędzidełka powoduje od samego początku nieprawidłowe ich brzmienie. Pojawia się wówczas seplenienie międzyzębowe, pararotacyzm czy rotacyzm.



Leczenie

Najczęściej po konsultacji laryngologiczno – logopedycznej dzieci z tym problemem kierowane są na zabieg podcięcia wędzidełka podjęzykowego, (freneotomii). Młodszym dzieciom (w okresie niemowlęcym) zalecamy podcięcie wędzidełka podjęzykowego w znieczuleniu miejscowym. U dzieci starszych rekomendujemy wykonanie 5 minutowego, minimalnie inwazyjnego zabiegu najnowszą techniką z wykorzystaniem Lasera Diodowego.

Obie metody są obecnie uważane za najbezpieczniejsze jak i najbardziej efektywne. Sam zabieg jednak nie rozwiązuje problemu, podcięcie jedynie zwiększa ruchomość czubka języka. W przeciągu 3 dni od wykonania zabiegu, dziecko powinno być objęte opieką logopedyczną by rozpocząć ćwiczenia "usprawniające" język. Wówczas uczymy go



nowej i wcześniej nieznannej dla niego funkcji podnoszenia (pionizacji języka). Ćwiczenia logopedyczne wykonywane po zabiegu rozciągają wędzidełko i zapobiegają powstawaniu zrostów i blizn.

Pamiętajmy!

Nie lekceważmy żadnych nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych naszych dzieci. Niewłaściwe postępowanie w przypadku przyrośniętego wędzidełka niesie za sobą nie tylko problemy ze sposobem połykania czy wadę wymowy, często także skutkuje problemami emocjonalnymi czy trudnościami w nauce czytania i pisanie.



Centrum Medyczne dysponuje w pełni wyposażonymi, nowoczesnymi gabinetami diagnostyki i chirurgii laryngologicznej oraz okulistycznej. Ośrodek specjalizuje się w chirurgii jednego dnia, w której wykorzystywane są najnowsze techniki operacyjne. Dzięki temu szybko i skutecznie pomagamy naszym pacjentom, zapewniając maksymalny komfort.

ul. Słomińskiego 19
lok. 503 i 510
00-195 Warszawa
www.mml.com.pl

Informacje i zapisy:
tel. (22) 406 54 22



To miejsce stworzone dla twojego dziecka - zajmujemy się kompleksową diagnozą logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz diagnozą i terapią procesów Integracji Sensorycznej. Wysoko wykwalifikowana kadra logopedów, pedagogów i psychologów, spowoduje, że Państwa dziecko będzie się tu czuło bezpiecznie.



Warszawa Kabaty,
ul. Wąwozowa 30/1
www.logos.edu.pl

Informacje i zapisy:
tel. (22) 408 86 86

Zapewniamy najwyższy poziom usług laryngologiczno-logopedycznych.